

Vaka Çalışması: Ülserlerde Suprathel Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,

Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi

VAKA ÇALIŞMASI 4 - (R.K. 79, KADIN) VENÖZ ÜLSER

Hasta hastanemize ilk olarak 5 Mayıs 2007 tarihinde geldi. İlk bulgulara, sağ ayak bileğinin dışında yaklaşık 1 yıldır iyileşmeyen bir yara olduğu ve daha önce uygulanan yara tedavi yöntemleriyle (hidrokolloidler) sonuç alınmadığı belirlendi. Buna ek olarak, sol alt bacakta ülser tedavisinin uygulandığı, yaranın kapandığı ancak dokunun stabil olmadığı görüldü. Her iki bacakta da arteriyel problem olması durumu zorlaştırmakta ve sağ bacakta halihazırda bir baypas operasyonu gerektiği düşünülmektedir (ayaktan nabız alınamamakta). Dopler sonografik görüntülemenin ardından, sağ bacakta artery tibialis anterior'un yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple gerekli olan bası terapisi, hastada görülen dolaşım bozukluğu sebebiyle uygulanamamaktadır.

Yaranın bir kısmı arteriyel bir kısmı ise venöz ülser olarak teşhis edildi. Sağ ayak bileğini çevreleyen dokunun şiştiği ve kızardığı tespit edildi. Defektin merkezinde iki adet orta büyüklükte epitelyum enklavı bulunmakla beraber önemli ölçüde şiş ve kızarıklık oldukları görülmektedir.

Dolaşım bozukluğunun kötü durumda olmasına karşın hasta evden tedavi edilmeye başlanmıştır.



TEDAVİ BAŞLANGICI 9 MAYIS 2007



TEDAVİ BAŞLANGICI 9 MAYIS 2007



TEDAVİ BAŞLANGICI 9 MAYIS 2007

VAKA ÇALIŞMASI 4 (R.K. 85, KADIN) VENÖZ ÜLSER

Vaka Çalışması: Ülserlerde Suprathel Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi

Tedavinin ilk 2 haftasında Suprathel 4 günde bir değiştirildi. Bundan sonra değişimler yaradaki sekresyon düzeyi azaldığından haftada bir yapılmaya başlandı. Tedavi başlangıcında (09/05/2007) Suprathel yaranın tamamı üzerinde yerleştirildi ancak tedavinin devamında (14/05/2007) membranın tam yara yüzeyine göre kesilerek uygulanmasının daha avantajlı olduğu görüldü.



14 MAYIS 2007



14 MAYIS 2007

Hasta, Suprathel kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ağrıda belirgin azalma olduğunu belirtti. 20 Mayıs 2007 tarihli fotoğrafta, baskı çorabı kullanılamamasına rağmen, yara kenarlarındaki şişlik ve kızarıklığın azaldığı belirgin bir şekilde görülmektedir.



20 MAYIS 2007



20 MAYIS 2007

13 Haziran'da çekilen fotoğraflarda ise yaranın büyük oranda küçüldüğü ve diğer yumuşak dokuların da daha iyi durumda oldukları görülebilir. Önceki sene gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan Arteriyel rahatsızlık dolayısıyla yaşanan sorunlara rağmen bu kadar sonuç alınmış olması büyük başarı olarak görülmektedir. Bu tedavi, 5 aylık sürecin sonunda başarı ile sonuçlandı.

VAKA ÇALIŞMASI 4 (R.K. 85, KADIN) VENÖZ ÜLSER

Vaka Çalışması: Ülserlerde Suprathel Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi

Bu tarihten sonra Suprathel değişimleri haftada bir yapıldı. Daha önce yerleştirilen ürün çıkarıldıktan sonra yara Octanicept solüsyon ile dezenfekte edildi ve müteakiben yeni Suprathel membran yara yüzeyine tam oturacak şekilde kesilip şekillendirilerek uygulandı.

Çevreleyen doku koruyucu merhemlerle tedavi edildi. Diğer ürünler (Hidrokolloidler) gibi yara etrafında maserasyona sebep olmayan Suprathel membran beraberinde çevreleyen dokuyu korumak amacıyla herhangi bir başka ürüne gerek duyulmadı. Ürünün tedavi başladıktan hemen sonra acıyı azaltmış olması ise hasta açısından avantajlı olmuştur.



6 HAZİRAN 2007



6 HAZİRAN 2007



13 HAZİRAN 2007



13 HAZİRAN 2007

Vaka Çalışması: Ülserlerde **Suprathel** Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi



05 TEMMUZ 2007



05 TEMMUZ 2007



09 EYLÜL 2007



09 EYLÜL 2007